

BOLLETTINO DIFESA INTEGRATA DI BASE

SPECIALE COLPO DI FUOCO (*Erwinia amylovora*)

Nei giorni scorsi in Valsugana è stata riscontrata la presenza del colpo di fuoco (*Erwinia amylovora*) con numerosi focolai di infezione.

Tutti i frutteti possono essere colpiti dalla batteriosi, ma quelli più a rischio sono i giovani impianti e specialmente quelli realizzati questa primavera, che hanno fiorito in ritardo.

In considerazione della preoccupante situazione riscontrata si consiglia di controllare tutti i giovani impianti eseguendo il controllo in giornate con bel tempo e su vegetazione asciutta.

SINTOMI

I sintomi principali della malattia sono:

- germogli che disseccano a partire dall'apice assumendo il classico ripiegamento a "pastorale"
- frutticini o fiori che disseccano assumendo una colorazione nerastra del picciolo



- foglie che disseccano con annerimento della lamina a partire dal picciolo e dalla nervatura principale
- frutticini che anneriscono a partire dal piccolo



- cancri sul legno (depressioni con bordo annerito).
- in alcuni casi è possibile osservare la presenza di gocce di essudato sugli organi colpiti.



I sintomi non interessano in genere l'intera pianta, ma singoli mazzetti e/o germogli.

Si raccomanda di:

- 1. NON TOCCARE PIANTE CON SINTOMI SOSPETTI** ma osservarle con attenzione per verificare che il disseccamento non sia dovuto ad altre cause (es. rottura meccanica, zeuzera, ecc.)
- 2. SEGNALARE al tecnico di zona** i casi sospetti prima di procedere con le operazioni di pulizia, al fine di effettuare i necessari accertamenti e definire le operazioni conseguenti.
- 3. ELIMINARE eventuali rifioriture tardive in giornate di bel tempo.**