

BOLLETTINO DIFESA INTEGRATA DI BASE

SPECIALE FLAVESCENZA DORATA (*Scaphoideus titanus*)

Misure di contenimento della Flavescenza dorata della vite

Nelle ultime settimane è stato rilevato che in alcune aree della provincia i focolai di Flavescenza dorata si stanno espandendo e alcuni nuovi gravi scoppi epidemici si sono verificati. In queste situazioni la comparsa di piante sintomatiche sta avvenendo in maniera precoce e molto veloce, con vigneti che risultano già compromessi.

Maggiori informazioni sono disponibili al link [//fitoemergenze.fmach.it/flavescenza-dorata](http://fitoemergenze.fmach.it/flavescenza-dorata)

Nell'ambito della lotta obbligatoria a Flavescenza dorata (determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della PAT n. 463 del 10/06/2021):

- 1. si ricorda che in tutta l'area vitata della provincia di Trento è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di viti di estirpare immediatamente ogni pianta che presenti sintomi di Flavescenza dorata**
- 2. si consiglia di eseguire un terzo intervento insetticida:**
 - dal 12 al 17 luglio nelle zone di fondovalle e bassa collina
 - dal 17 al 24 luglio nell'alta collina**con uno dei seguenti prodotti fitosanitari:**
 - Tau-fluvalinate (es. Evure Pro 0,3 l/ha, Klartan 20 EW 0,3 l/ha, Mavrik EW 0,3 l/ha)
 - Piretro a dosaggi vari di etichetta.

Indicazioni

- È importante bagnare bene tutta la vegetazione della vite, fusto compreso, con volumi di acqua per ettaro elevati (fino a 15 hl) aprendo anche gli ugelli più bassi della raggiera.
- È preferibile eseguire il trattamento insetticida da solo e trattare ala per ala nelle pergole doppie.
- Nelle aziende a conduzione biologica utilizzare prodotti consentiti a base di piretro.
- Nel caso dell'utilizzo del piretro, è necessario trattare nelle ore serali, acidificando la miscela fitosanitaria.

Tutela degli insetti pronubi

- Qualora non sia stato effettuato recentemente, è necessario eseguire lo sfalcio del cotico erboso nell'interfila e nel sottofila del vigneto prima del trattamento insetticida per una maggior salvaguardia dei pronubi e per raggiungere meglio con il trattamento i fusti delle viti e gli eventuali polloni presenti.
- Avvisare gli apicoltori nelle vicinanze dell'imminente trattamento insetticida.
- Effettuare il trattamento dopo il tramonto del sole o al mattino prima dell'inizio del volo delle api.