

BOLLETTINO DIFESA INTEGRATA DI BASE

L'inverno 2021-2022 è stato caratterizzato da temperature sopra alla media degli ultimi vent'anni. La piovosità di gennaio è stata scarsa. A febbraio si è registrata una nevicata, nei primi 2 mesi dell'anno la stazione meteo di S. Michele all'Adige ha registrato precipitazioni totali che superano di poco i 50 mm. Marzo è stato caratterizzato da tempo molto soleggiato, l'unico evento piovoso si è concentrato tra fine marzo e i primi due giorni di aprile. Le temperature medie di aprile si sono mantenute sotto la media, le piogge hanno quasi raggiunto i valori medi.

	Temperatura*	Piovosità*
GENNAIO	Inferiore alla media (2,5 °C)	Inferiore alla media (25,4 mm)
FEBBRAIO	Superiore alla media (5,6°C)	Inferiore alla media (27,8 mm)
MARZO	Inferiore alla media (8,2°C)	Inferiore alla media (3,4 mm)
APRILE	Inferiore alla media (prime 4 settimane)	Inferiore alla media (prime 4 settimane)

*dati stazione meteo di S. Michele all'Adige riferiti alla media degli ultimi 20 anni.

MELO

Zone di collina

Stadio fenologico

Siamo nello stadio di piena fioritura nelle zone più precoci e inizio fioritura nelle zone più tardive.

Ticchiolatura

In questa fase fenologica il melo è molto sensibile a questo fungo. Intervenire con prodotti di copertura prima di un evento piovoso oppure con dei prodotti che hanno azione nella finestra di germinazione delle ascospore. Ove non possibile applicare queste strategie, utilizzare un prodotto ad attività retroattiva.

Oidio

Impiegare un antioidico ogni 10-15 giorni, in funzione dello sviluppo del germoglio.

Diradamento fiorale

È possibile impiegare prodotti che hanno una azione di diradamento fiorale, soprattutto sulle varietà che non tollerano il NAD.

Gestione della vigoria

Per ridurre lo sviluppo dei germogli negli impianti più vigorosi, impiegare un prodotto registrato a tale scopo, quando la lunghezza del germoglio è di circa 4-5 centimetri.

Zone di fondovalle

Stadio fenologico

Siamo nello stadio fenologico di caduta petali - allegagione (diametro frutticini 5-8 mm).

Ticchiolatura

Si consiglia, attraverso la consultazione frequente delle previsioni meteo, di posizionare prima di eventuali piogge interventi preventivi o tempestivi su pianta bagnata.

L'accrescimento fogliare in questo periodo è di circa 1 foglia ogni 3-4 giorni.

Oidio

Nelle zone soggette all'oidio (o mal bianco) è bene iniziare una difesa molto attenta già in questo periodo con prodotti specifici.

Tutela dei pronubi



In caso di presenza di fiori nell'interfilare, si ricorda di sfalciare l'erba prima del trattamento insetticida. Lo sfalcio va effettuato al mattino presto o alla sera, quando le api non si trovano sui fiori. Il Decreto provinciale 8 agosto 2012 stabilisce che è vietato trattare con insetticidi, acaricidi ed erbicidi durante la fioritura del melo.

Difesa

Solo dopo la completa caduta dei petali e l'allontanamento delle arnie dai frutteti, è possibile effettuare i trattamenti insetticidi specifici per afidi, ricamatori (se sono state rilevate larve svernanti) e psille (se indicato dagli avvisi di zona).

Cosmesi e allungamento dei frutti

Impiegare a cadenza settimanale, per 3-4 volte, fitoregolatori che riducono il rischio di rugginosità dei frutti e che ne migliorano la forma. Ripetere a cadenza settimanale i trattamenti cosmetici su Golden Delicious con zolfo, caolino e un fitoregolatore a base di gibberelline al fine di prevenire la rugginosità dei frutti. Distanziare di 2 giorni le gibberelline da proexadione calcio e amide.

Diradamento

Sulle varietà Golden Delicious e Gala, che presentano una buona fioritura, si consiglia di eseguire un intervento diradante con amide. Prima di eseguire l'intervento controllare accuratamente la presenza di danni da gelo, soprattutto nella parte bassa della chioma.

Nutrizione fogliare

L'assorbimento fogliare rappresenta una via di somministrazione rapida ed efficace, complementare rispetto a quella radicale, soprattutto quando i terreni sono ancora freddi e nel caso di carenze conclamate. In questo periodo si possono impiegare azoto, magnesio e manganese.

ACTINIDIA

Batteriosi (PSA)

In questo periodo, dall'affioramento dei germogli e in caso di precipitazioni previste, è possibile intervenire preventivamente per proteggere le piante dalla batteriosi (PSA) con prodotti a base di rame o prodotti specifici.

SUSINO

Stadio fenologico

La maggior parte delle zone collinari si trova in corrispondenza della piena fioritura del susino.

In questo momento è vietato intervenire con prodotti insetticidi.

In caso di precipitazioni abbondanti, per contrastare monilia e corineo durante il periodo della fioritura e fino alla scamicatura-allegagione nelle zone più precoci, è possibile intervenire con prodotti fungicidi specifici.

OLIVO

Stadio fenologico

Attualmente l'olivo, nelle zone più precoci, è nella fase fenologica di inizio mignolatura.

Pratiche agronomiche di stagione

Potatura

Per attenuare il fenomeno dell'alternanza di produzione è consigliato effettuare una potatura adeguata, in modo da evitare eccessi produttivi e per permettere un corretto accrescimento dei rami misti.

Assecondare l'elevata produzione, che probabilmente ci sarà quest'anno, significa favorire i meccanismi che inducono il processo di alternanza di produzione.

Insetti

Mosca olearia

La strategia, che verrà adottata quest'anno nella difesa da questo dittero, sarà diversificata negli strumenti utilizzati:

- **preventiva**, utilizzando dispositivi idonei per la cattura di massa;
- **collettiva**, perché la cattura di massa della mosca olearia funziona se viene adottata da tutti gli olivicoltori;
- **tempestiva**, perché è richiesto all'olivicoltore di intervenire prontamente.

Nelle trappole dove si effettua il monitoraggio, si rileva un'elevata presenza della mosca dell'olivo. Pertanto, è fondamentale sostituire i vecchi dispositivi utilizzati per la cattura di massa del dittero con quelli nuovi. Un'esposizione precoce delle trappole, sia nelle olivete che nei centri urbani, aiuta a ridurre la popolazione estiva di questo insetto.

Euzophera spp.

Dove presente deve essere asportata con la potatura dalla chioma e la ramaglia colpita va allontanata dall'oliveto.

Patogeni

Prima di effettuare il prossimo intervento fungicida con rame e zolfo, per contenere funghi e batteri, aspettare ancora qualche giorno affinché le mignole si accrescano.

Drosophila suzukii

In questa fase le femmine svernanti iniziano a muoversi cercando nutrimento per riprendere l'attività. Non essendo a disposizione molte fonti nutritive, l'attrattività delle trappole è maggiore.

Le trappole per la cattura massale (ad es. Biobest color rosso) caricate con una miscela di aceto di mela (150 ml), vino rosso (50 ml) e un cucchiaino di zucchero di canna grezzo sono le più attrattive e catturano un maggior numero di individui di *D. suzukii*.

Disporre le trappole ai margini dei boschi attorno agli impianti, anche in assenza di coltura in atto, dato che la cattura massale è molto importante nella fase primaverile.

Si sono già osservate le prime ovideposizioni su bacche di edera, unica bacca disponibile in questo periodo e presente in diversi siti, in particolare nelle zone boschive.



Trappola per
Drosophila suzukii

FRAGOLA

Altitudine < 600 m s.l.m.:

- controllare la presenza di oziorrinco ed eventualmente impiegare i nematodi entomopatogeni;
- intervenire contro l'oidio;
- controllare EC e pH del percolato (20%) e della fertirrigazione.

Controllare la presenza di forme svernanti di ragnetto rosso sulla pagina inferiore delle foglie.

Prima di eseguire gli interventi, tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; questa operazione va fatta al di fuori dal volo delle api.

Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.



Piante di fragola trapiantate

Altitudine > 600 m s.l.m.:

- terminare la pulizia delle piante svernate;
- controllare lo stato delle piante e la fase fenologica.

Sezionando alcune piante a campione è possibile stimare l'entità di eventuali danni da freddo, da fitoftora o antracnosi.

MORA

Monitorare la crescita dei germogli laterali e prevedere un eventuale controllo dell'eriofide. Valutare se è necessario un intervento per l'eriofide della mora con le temperature idonee.

Prima di eseguire gli interventi tagliare il prato sottostante al filare qualora vi siano essenze in fiore; quest'operazione va svolta fuori dal volo delle api. Trattare in giornate miti, senza vento e nelle prime ore del mattino o in tarda serata per rispettare il volo degli insetti pronubi.

È consigliato l'apporto di letame maturo o di compost di qualità per contribuire a migliorare la fertilità del suolo. Iniziare con la distribuzione in fertirrigazione di un concime complesso idrosolubile o fertirrigazione standard (come lampone).

LAMPONE FUORI SUOLO

Esporre le piante e iniziare la concimazione con la fertirrigazione standard.

La fase fenologica varia in funzione dell'altitudine e della data di esposizione delle piante di lampone unifero e corrisponde in linea generale ad allungamento germogli.



*Crescita polloni di lampone
rifiorente*



*Piante di lampone fuori suolo
appena esposte*

LAMPONE IN SUOLO

Lampone unifero: controllare lo stato delle piante e la fase fenologica delle gemme che è variabile in funzione dell'altitudine e della varietà.

Lampone rifiorente: verificare la crescita dei polloni per la produzione autunnale.

È consigliato l'apporto di letame maturo o di compost di qualità per contribuire a migliorare la fertilità del suolo. Cominciare l'irrigazione e le concimazioni con concime complesso o con la fertirrigazione standard quando i germogli raggiungono la lunghezza di 5 cm.

RIBES

Controllare le fasi fenologiche ed eseguire la concimazione. Nel caso di fertirrigazione iniziare la distribuzione della soluzione dalle fasi successive alla ripresa vegetativa.

È anche consigliato l'apporto periodico di letame maturo o di compost di qualità per contribuire a migliorare la fertilità del suolo.

Iniziare la difesa antioidica e a partire dall'ingrossamento dei bottoni fiorali eseguire anche un antioidico di sintesi autorizzato su ribes.

MIRTILLO

Impollinazione

Posizionare le arnie dei bombi, se non già provveduto, anche alle quote più elevate in zone di collina. Le arnie dei bombi vanno poste una settimana prima dell'apertura dei primi fiori.

Sono vietati trattamenti insetticidi e di diserbo durante la fioritura. Lo sfalcio dell'erba va fatto al mattino presto o la sera al di fuori del volo dei pronubi.

Concimazione

Eeguire la concimazione a spaglio frazionando la distribuzione. Nel caso di fertirrigazione proseguire fino a metà - fine giugno in funzione dell'altitudine. In primavera piovose, dove non è possibile fertirrigare, per non bagnare eccessivamente il terreno si consiglia di intervenire con la concimazione a spaglio.



Imminente fioritura di mirtillo



Corretta postazioni per arnie di bombi

CILIEGIO

Stadio fenologico

La cultivar Kordia, in fondovalle, è nella fase fenologica di scamicatura-allegagione, in zone collinari mediamente è a fine fioritura e nelle zone più tardive in fioritura.

Trattamenti

Nei ceraseti dalla piena fioritura alla completa scamicatura, in previsione di piogge, è importante intervenire per il controllo di monilia e corineo, trattando quando non c'è volo delle api. Alla completa caduta petali, una volta allontanati gli alveari, è possibile intervenire con un prodotto insetticida per il controllo dell'afide nero.

Concimazioni

Per quanto riguarda la concimazione, durante la fioritura è possibile apportare zinco, boro e azoto (urea) tramite una concimazione fogliare. Nella fase di post-fioritura, è possibile apportare magnesio, manganese, zinco, calcio tramite concimazioni fogliari e somministrare i macroelementi (azoto, fosforo, potassio) a spaglio o attraverso la tecnica della fertirrigazione. È importante aggiustare i quantitativi in funzione dei danni da freddo, dell'allegagione e della vigoria dell'impianto.

VITE

Stadio fenologico

Nelle zone più precoci la vite ha raggiunto lo stadio di 4 foglie distese.



Stadio fenologico 4/5 foglie distese

Bostrico

Posizionare nei vigneti, ove si riscontrano danni, le fascine esca per il bostrico in numero di una ogni 20 metri lineari, ad un'altezza di 1,5 metri da terra, utilizzando i tralci potati. A maggio dovranno essere rimosse (foto).



Fascine esca

Acaro giallo

Nei vigneti dove era presente negli scorsi anni, verificare la presenza di ragno giallo, che si manifesta con crescita stentata delle prime foglie e punteggiatura delle stesse.

Difesa dalle tignole: confusione sessuale

In questi giorni vanno applicati in campo i diffusori per la confusione sessuale.



Dispenser per la confusione sessuale

Concimazione primaverile

Con l'aumentare delle temperature e l'inizio del risveglio vegetativo è possibile eseguire le operazioni di concimazione primaverile.

Gestione dell'erba sulla fila

Non è possibile eseguire in primavera il diserbo chimico con glifosate, a parte, in deroga, per alcune particolari situazioni. Intervenire con macchine che eliminano le infestanti meccanicamente.

Giallumi della vite

Si raccomanda di ESTIRPARE le viti che nello scorso autunno sono state segnate con un nastro giallo che indicava la presenza di sintomi di giallumi.



Vite da estirpare