

Provincia Autonoma di Trento

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA

DIFESA ROVO INERME 2015

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME			
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni azotate - allevare 4-5 tralci per ceppo - adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa fogliare - asportare dall'apezzamento i residui della vegetazione estiva	(Boscalid + Pyraclostrobin) (1) (2)	(1) Al massimo 2 interventi all'anno (2) Non ammesso in serra
Antracnosi (<i>Elsinoe veneta</i>)	Interventi agronomici: - evitare eccessi di azoto	Prodotti rameici (3)	(3) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati
Ruggine (<i>Phragmidium</i> spp.)		Prodotti rameici (3)	Interventi autunnali (3) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati
VIROSI			
Virosi	Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano - adottare razionali rotazioni colturali		
FITOFAGI			
Antonomo (<i>Anthonomus rubi</i>)		Piretro Acetamiprid (8)	(4) Al massimo 3 interventi all'anno (8) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
Mosca dei tralci (<i>Lasioptera rubi</i>)	Interventi agronomici: - asportare i tralci colpiti e distruggerli.	Spinosad (4)	
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	Interventi agronomici: - si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele; - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	Cattura massale con trappole innescate con esca alimentare Acetamiprid (8)	Gli insetticidi piretroidi e spinosine previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro la <i>Drosophila</i> (8) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi (<i>Aphis ruborum</i> , <i>Amphorophora rubi</i>)	Interventi agronomici: - evitare eccessi di azoto.	<i>Beauveria bassiana</i> Azadiractina Olio minerale (5) Etofenprox (6) (7) Thiaclopid (8) Acetamiprid (8)	(5) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati. (6) Al massimo 1 intervento all'anno (7) Può favorire attacchi di ragnetto rosso (8) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
Cicaline	Interventi agronomici: - razionalizzare gli apporti di azoto	Etofenprox (6) (7) Thiaclopid (8) Acetamiprid (8)	(6) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità (7) Possono favorire attacchi di ragnetto rosso (8) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
Lepidotteri (tortricidi, piralide)		Spinosad (4)	(4) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati. Al massimo 3 interventi all'anno
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)		<i>Beauveria bassiana</i> Olio minerale (5) Exitiazox (9) Abamectina (10)	(4) Attenzione alle registrazioni dei formulati impiegati (9) Al massimo 1 intervento all'anno (10) Al massimo 1 intervento all'anno
Eriofide (<i>Acalitus essigi</i>)	Interventi chimici: Intervenire in caso di forti attacchi verificatisi sulla coltura nell'anno precedente	Zolfo bagnabile	Su prescrizione del tecnico; interventi alla ripresa vegetativa
Oziorrinco		<i>Metarhizium A. Var Anisopliae</i> Nematodi	Impiego nella preparazione del terriccio per pianta in vaso
Lumache e limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di infestazione generalizzata	Fosfato ferrico	